



1 Harrier Court
Airfield Business Park
Elvington
York YO41 4AU
Royaume Uni
Tel: +44 (0) 1904 607600
Fax: +44 (0) 1904 607601
Web: www.vet-way.com

TYLAVET INJECTABLE 100 ml

Type	Antibiotique
Composition	Chaque ml contient 200 mg de Tylosin dans 50 % de propylène glycol avec 4 % d'alcool de benzol.
Utilisations	BOVINS, PORCINS
Indications	Chez les bovins, actif contre les pneumonies, adultes du veau, les mammites et les piétins. Chez les porcins, contre l'entérite hémorragique, Erysipelothrix et la pneumonie enzootique.
Posologie et administration	IM seulement. Une seringue et aiguille hypodermiques sèches doivent être utilisées. Il est fortement recommandé d'alterner les points d'injection lorsque ces dernières sont journalières. Bovins: 4-10 mg par kg (1 ml par 20-50 kg)/jour Porcins: 2-10 mg par kg (1 ml par 20-100 kg)/jour Chez les porcins les doses doivent être étudiées de manière à ce que l'on dépasse pas 1.3 ml par injection.
Précautions d'emploi	Tylavet ne doit pas être administré aux poulets et aux dindes. Ne pas administrer aux équins: une injection peut être fatale.
Délais d'attente	<u>Viande et abats:</u> Les animaux destinés à la consommation humaine ne doivent pas être abattus pendant la durée du traitement. Bovins: 28 jours Porcins: 21 jours <u>Lait</u> Bovins: 108 jours (9ème traite) après le dernier traitement. (Si 2 traites par jour). Porc: 14ème traite

